


Figure 1. Algorithme éthique proposé par le CHU de Liège pour l'admission en USI des patients COVID.



Performance status (PS) ou échelle de statut de performance* : 0. Patient entièrement actif - 1. Patient restreint dans ses activités physiques, mais ambulatoires - 2. Patient ambulatoire mais incapable d'effectuer des activités - 3. Patient capable de soins limités, alité ou au fauteuil > 50 % de la journée - 4. Patient complètement handicapé, totalement alité ou confiné au fauteuil.

Clinical frailty score ou score de fragilité clinique * : 1-3. Patient autonome - 4. Patient «vulnérable», autonome mais légère limitation fonctionnelle - 5. Patient «légèrement fragile», nécessitant de l'aide pour les courses ou la marche extérieure - 6. Patient «modérément fragile», nécessitant de l'aide pour l'habillage et la cuisine - 7. Patient en «dépendance totale» pour les actes de la vie quotidienne - 8-9. Patient en déclin fonctionnel notable voire grabataire.

Palliative Care Indicators Tool (PICT) ou outil d'indicateurs de soins palliatifs * : est une échelle permettant d'identifier un patient palliatif à un stade plus précoce de sa maladie.

Le score SOFA (Sepsis-related Organ Failure Assessment) ou score d'évaluation des défaillances organiques liées au sepsis * est utilisé en soins intensifs pour déterminer et suivre l'état d'un patient en défaillance d'organe. Le score s'appuie sur six sous-scores, un pour chaque système (respiratoire, neurologique, cardiovasculaire, hépatique, rénal et coagulation).

Multiple organe failure (MOF) ou défaillance organique multiple * : défaillance simultanée ou successive d'au moins deux organes principaux.

* **Early warning score.** Organ R, Lloyd-Williams F, Wright M, et al. An early warning scoring system for detecting developing critical illness. 1997.

* **Performance status.** Oken MM, Creech RH, Tormey DC, et al. Toxicity and response criteria of the Eastern Cooperative Oncology Group. Am J Clin Oncol 1982;5:649-55.

* **Frailty scale.** Rockwood K, Song X, MacKnight C, et al. A global clinical measure of fitness and frailty in elderly people. CMAJ 2005;173:489-95.

- * ***Palliative Care Indicators Tool.*** Highet G, Crawford D, A Murray S, et al. Development and evaluation of the Supportive and Palliative Care Indicators Tool (SPICT): a mixed-methods study. *BMJ Support Palliat Care* 2014;4:285-90.
- * ***SOFA score.*** Vincent JL, Moreno R, Takala J, et al. The SOFA (Sepsis-related Organ Failure Assessment) score to describe organ dysfunction/failure. On behalf of the Working Group on Sepsis-Related Problems of the European Society of Intensive Care Medicine. *Intensive Care Med* 1996;22:707-10.
- * ***Multiple organe failure.*** Knaus WA, Draper EA, Wagner DP, et al. Prognosis in acute organ-system failure. *Ann Surg* 1985;202:685-93.